



## ISTEROSCOPIA DIAGNOSTICA

### Che cos'è



L'isteroscopia diagnostica (HSC) è un esame ambulatoriale che consente la visione diretta della cavità uterina attraverso uno strumento chiamato isteroscopio. L'esame non necessita di anestesia, digiuno o di preparazione particolare.

### Quando si esegue

- in età fertile nel periodo post-menstruale (tra il 7° ed il 13° giorno dall'inizio delle mestruazioni)
- in età fertile, in assenza di ciclo mestruale, con test di gravidanza negativo
- in altre fasi del ciclo (se lo specialista lo richiede)
- in menopausa è sempre possibile (in assenza di perdite ematiche)

### L'isteroscopio

E' uno strumento rigido e sottile di diametro 3-5 mm., munito di lenti e collegato ad una telecamera che consente la visione diretta e ingrandita della cavità uterina su monitor.





UNIVERSITÀ DEGLI STUDI  
DI PADOVA

AZIENDA OSPEDALIERA  
DI PADOVA



FACOLTÀ DI MEDICINA E CHIRURGIA  
DIPARTIMENTO DI SCIENZE GINECOLOGICHE E DELLA RIPRODUZIONE UMANA  
U.O.C. di CLINICA GINECOLOGICA e OSTETRICA  
Direttore : Prof. Giovanni B. Nardelli

## L'esame

Si tratta di un'indagine che dura pochi minuti e si esegue introducendo l'isteroscopio nella cavità uterina, attraverso la vagina e il canale cervicale (senza dilatazione).

Per distendere la cavità dell'utero e renderne possibile la visione, si utilizza un mezzo liquido (soluzione fisiologica sterile).

Una volta raggiunta, la cavità uterina, visualizzata in un monitor, può essere ispezionata e fotografata dal medico che può, se lo ritiene opportuno, eseguire un prelievo biotico della mucosa endometriale.

L'esame isteroscopico può causare un lieve dolore addomino-pelvico (simil-mestruale) che si risolve, generalmente in breve tempo.

Solo nel 4% delle donne non è possibile eseguire l'HSC per stenosi serrata del canale del collo dell'utero.

## Complicanze

Sono rarissime ( 1 caso su 1000). Le principali consistono in:

- Reazione vagale con abbassamento della pressione arteriosa, della frequenza cardiaca, sudorazione ecc.
- Perforazione della parete uterina che, in rari casi, richiede il ricorso all'atto chirurgico
- Infezione pelvica con iperpiressia a distanza di circa 24 ore.

## Controindicazioni

- Gravidanza
- Infezione vaginale o pelvica in atto